


*ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»*

**Проблемы профилактики  
ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге.  
Вопросы стигмы и  
дискриминации детей с ВИЧ**

Долганова Марина Викторовна  
специалист по социальной работе  
отдела профилактики  
и психосоциального консультирования


# ПОРАЖЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА (АБСОЛЮТНОЕ ЧИСЛО И %)



# Пути передачи ВИЧ-инфекции (%)




**Доля различных возрастных групп среди  
ВНОВЬ выявленных в 2019 г. (%)**



# дети с ВИЧ-инфекцией в Свердловской области на 01.01.2020г.


(с диагнозом ВИЧ всего 1014 детей, в Екатеринбурге -298)



## **ИЗ 1014 ДЕТЕЙ ЖИВУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

- перинатальным путем получили ВИЧ-инфекцию - 960 детей
- наркотическим путем – 5 детей
- половым путем – 27 детей
- парентеральным путем в быту – 17 детей
- гомосексуальным половым контактом – 1 человек
- парантеральным путем в больничных условиях – 4 ребенка

# Высокая смертность от ВИЧ в Екатеринбурге (показатель на 100 тысяч населения)




На смертность, а также на распространение ВИЧ  
влияет ряд фактов:

- ✓ Ранняя диагностика ВИЧ
- ✓ Своевременная постановка на учет
- ✓ Раннее начало лечения

## Причины отказа от терапии (неприверженности):


1. Травматичный жизненный опыт (негативный опыт сотрудничества с медиками). Аутостигматизация
2. Зависимость от мнения окружающих (чем пользуются люди без ВИЧ, но с манией величия)
3. Страх смерти (желание спрятаться от угрозы)
4. Низкий уровень образования
5. Искраженные представления о ВИЧ (иногда из-за **низкоквалифицированной консультации!!!!!!**)




40 детей умерло  
с 2001 по 2019 гг.

27 детей по причине  
прогрессирования ВИЧ

## Данные по г. Екатеринбург по умершим женщинам



**Всего сирот за 2019г  
по причине let матери - 271 детей**




# ДИСКРИМИНАЦИЯ - СТИГМА, КОТОРАЯ СТАЛА ДЕЙСТВИЕМ


- В вопросах стигмы (ярлыка) очень часто упускается один важный компонент - **СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ**. Каждый человек может навешивать ярлыки и стигматизировать других, но при отсутствии власти эта стигма не может стать своим воплощением - дискриминацией.



**СТИГМАТИЗА́ЦИЯ** (от ГРЕЧ. **στίγμα** - «ПЯТНО, ЗНАК, КЛЕЙМО») - *КЛЕЙМЕНИЕ, НАНЕСЕНИЕ СТИГМЫ*



# ФАКТОРЫ , СПОСОБСТВУЮЩИЕ СТИГМАТИЗАЦИИ ВИЧ+ В ОБЩЕСТВЕ



- ВИЧ/СПИД – заболевание угрожающее жизни.
- Люди, которые недостаточно знают о ВИЧ и его действиях на организм, ассоциируют ВИЧ-инфекцию с плохим самочувствием и ужасным пугающим изменением внешности.
- ВИЧ является инфекцией, а инфекций традиционно боятся.
- Люди ассоциируют ВИЧ-положительных с теми, кто и до эпидемии ВИЧ стигматизировался в обществе: гомосексуалисты, наркозависимые, секс-работники.
- ВИЧ затрагивает тему секса, которая во многом табуирована и связана с различными моральными ограничениями, страхами, пороками и виной.
- ВИЧ затрагивает людей, которые чаще всего и без этого дискриминируются в обществе: женщин, подростков, мужчин практикующих секс с мужчинами, потребителей наркотиков.

# МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УМЕНЬШИТЬ СТИГМУ

- Информированность населения.
- Информированность самих ВИЧ положительных несовершеннолетних и их законных представителей.
- Группы поддержки - для взрослого населения и для несовершеннолетних.
- Программы, направленные на толерантное восприятие ВИЧ- положительных людей.
- «Обретение внутренней силы» - эмпаурмент.

**Борьба с предрассудками - длительный процесс, изменения происходят медленно, но они происходят и тем активнее в этом участвуют пациенты и их семьи!**




# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подготовка на базе ОЦ СПИД: педагогов общеобразовательных организаций по вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди учащихся (подготовлено более 5.000 специалистов).
2. В образовательных учреждениях проводятся обязательные специальные занятия по профилактике ВИЧ-инфекции с учащимися 9-11 классов.
3. Вопросы по ВИЧ-инфекции интегрируются в учебные предметы.
4. Проводится обучение родителей с получением информированного согласия.
5. Развивается волонтерское движение.
6. Проводятся социальные акции.
7. Ежегодный мониторинг эффективности мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (анкетирование), контроль со стороны Минобразования.

# ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ

Приказ Министерства  
здравоохранения  
Свердловской области и  
Министерства общего и  
профессионального  
образования Свердловской  
области  
от 01.12.2011г. №855-и/1344-п

**«О внедрении программы  
профилактики ВИЧ-инфекции  
в образовательных  
учреждениях Свердловской  
области»**





# РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ...ВСЕМИ (ВКЛЮЧАЯ ВИЧ+ ДЕТЕЙ УЧАЩИХСЯ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ НАШЕГО ГОРОДА) ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ

10-12 лет-объяснение психологических и физиологических изменений растущего организма «Я знаю, что со мной происходит»

12-15 лет – формирование мотивации на отказ от социального экспериментирования на себе « Я не спешу пробовать табак, алкоголь, наркотики, начинать сексуальную жизнь»

15-17 лет –формирование социально-ответственного поведения в отношении собственного здоровья «Я хочу быть здоровым, я знаю как уберечься от ИППП, наркотиков...»

17-18 лет – формирование мотивации к семейным  
брачным отношениям и безопасному сексу  
«Чтобы быть счастливым, надо быть  
здоровым, уметь любить и быть любимым»





Исаев Юра



# Определения

## ВИЧ:

**В**ирус

**И**ммунодефицита

**Ч**еловека


## СПИД:

**С**индром

**П**риобретенного


**И**ммуно-

**Д**ефицита



\*при отсутствии специального лечения

# РАЗМНОЖЕНИЕ ВИЧ



**Электронная микрофотография вируса,  
выделяющегося из CD4 клетки**

# СВОЙСТВА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

- Очень быстро погибает при кипячении - через 1-3 мин.
- Разрушается при 55 градусах – через 30 мин.
- Погибает при изменении pH среды и под воздействием любых дезинфицирующих веществ
- ВИЧ может сохраняться в высушенном состоянии в каплях крови и спермы, но как правило, количество вируса в высушенной крови недостаточно для заражения.
- Хорошо сохраняется при минусовых температурах.
- В период серого негативного окна (3-6 месяцев от момента попадания в организм) не выявляется на анализах ИФА

# Механизм заражения

- ✦ ВИЧ размножается только в крови человека, используя определенный вид клеток.
- ✦ Необходимое условие заражения – попадание вируса в кровь через инъекции или через слизистые оболочки.
- ✦ Вирус погибает во внешней среде, поэтому передача возможна только через биологические жидкости человека, содержащие достаточно высокое для заражения количество вируса.

***Благодарю за внимание!***

***Свердловский центр СПИД***

***г. Екатеринбург***

***Ул. Ясная, 46***

***(343) 240-89-94***

***[spid-prof@mis66.ru](mailto:spid-prof@mis66.ru)***

***[spid66.ru](http://spid66.ru)***